

115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.黃耆為瘡家之聖藥，下列何種情況最不適合使用黃耆治療？

- A.背疽腐化，膿毒不暢惡肉不脫者
- B.瘡瘍久敗，膿水淋漓之表虛之病
- C.老人及形體欠實者罹患瘡瘍之病
- D.瘡瘍之病伴隨上熱甚或胃納衰者

2.《靈樞·癰疽》提到「發於尻……其狀赤堅大，急治之，不治之，三十日死矣。」此病相當於肛門直腸周圍膿腫，此病病名為何？

- A.敦疽
- B.銳疽
- C.緩疽
- D.調疽

3.臀癰應與有頭疽及流注相鑑別，根據《中醫外科講義》，下列敘述何者正確？①臀癰為生於臀部肌肉豐厚處的急性化膿性疾病 ②有頭疽為發於肌膚之間的慢性化膿性疾病 ③臀癰初起紅腫熱痛，邊緣明顯，潰後流出膿血，伴腐肉脫落 ④有頭疽初起有粟粒膿頭，癢痛並作，腐爛時形如蜂窩 ⑤流注漫腫疼痛，不限於臀部一處，此處未癒，他處又起

- A.①②③
- B.①④⑤
- C.③④⑤
- D.①②④

4.關於疔瘡位置與其所歸屬經絡，下列敘述何者錯誤？

- A.反唇疔生於唇稜偏裏，上唇屬脾，下唇屬胃
- B.鎖口疔為心脾兩經所屬
- C.手丫疔歸屬大腸經
- D.托盤疔歸屬手厥陰、手少陰

5.根據《中醫外科講義》，下列關於風寒濕合而為病的敘述，何者錯誤？

- A.其病在筋骨者，可兼用針灸治療，則見效更速
- B.表現為筋骨麻痺不仁，或痛楚難受
- C.治應祛風和絡，活血通經，虛者兼補。可內服萬應膏加減
- D.可因三氣所受之輕重不同，是以見證亦各異
- 6.根據《中醫外科講義》，下列何者不是鵝掌風的起因？
- A.脾胃火熱
- B.楊梅餘毒未盡
- C.血燥復受風毒
- D.肝腎陰虧
- 7.下列那一種皮膚病的病因與真菌感染有關？
- A.桃花癬
- B.胎癬
- C.禿瘡
- D.蜘蛛瘡
- 8.45歲女性，皮損覆蓋有多層銀白色鱗屑，抓去鱗屑可見點狀出血，依《中醫外科講義》最可能的診斷為何？
- A.白屑風
- B.白疔
- C.癬瘡
- D.白駁風
- 9.有關風疹的病因，下列何者錯誤？
- A.汗出受風，風邪中表虛之人
- B.飲食不潔，毒邪內侵
- C.外感濕熱，滯於脾胃
- D.露臥乘涼，風邪中表虛之人
- 10.依《中醫外科講義》，治療白濁，若濕熱內蘊，使用下列那一藥方最適宜？
- A.八正散
- B.徙薪飲
- C.防風通聖散
- D.補中益氣湯
- 11.依據《中醫外科講義》，下列何者不是通乳導散法常用的中藥？

- A.貝母
- B.漏蘆
- C.木耳
- D.栝蒌

12.乳癰與漿細胞性乳腺炎之敘述，下列何者錯誤？

- A.漿細胞性乳腺炎通常發生於哺乳期婦女，與餵哺母乳方式不當有關
- B.漿細胞性乳腺炎腫塊發生於乳暈部，並大多伴有先天性乳頭凹陷內縮
- C.外吹乳癰腫脹疼痛部位在乳房部，並有結塊，乳汁分泌不暢
- D.即使經治療消退，漿細胞性乳腺炎仍可以復發或者經久不癒形成癭管

13.根據《中醫外科講義》，下列中醫常見病因之敘述，何者正確？

- A.風為百病之長，且有定體
- B.四彎風、癩風屬風與燥結合為病
- C.白屑風屬風與濕結合為病
- D.痛風、鶴膝風屬風、寒、濕三氣合而為病

14.李先生，38歲，為某半導體公司工程師，工作常熬夜加班，精神壓力大，下班後常跟同事一起吃燒烤喝啤酒，近二個月來容易便秘，口乾舌燥，同時眉間與兩側鼻翼皮膚開始出現紅疹，脫屑，出油，下列何者是最合適的中醫診斷病名？

- A.油風
- B.黃水瘡
- C.面遊風
- D.肥瘡

15.30歲男性，半年來全身皮膚病灶皆生，初形如粟米，搔癢無度，抓破後脂水浸淫成片，血痕累累，依《中醫外科講義》最可能的診斷為何？

- A.癬瘡
- B.火赤瘡
- C.血風瘡
- D.膿窠瘡

16.關於濕瘡的敘述，下列何者錯誤？

- A.生於下身之皮膚疾病，癢而搔之流水
- B.亦名腳氣瘡
- C.治宜利濕為主，如犀角散

D. 腫脹甚者可用五皮飲

17. 依《中醫外科講義》，舌疳初起最主要症狀為何？

A. 牙齦腫脹

B. 舌強言蹇

C. 喉嚨痛

D. 唇部紅腫

18. 依《中醫外科講義》，下列癭症何者屬於惡性癌症？

A. 肉癭

B. 石癭

C. 氣癭

D. 血癭

19. 下列何者不是乳癌患者中醫常用治療之內服處方？

A. 季芝鯽魚膏

B. 散腫潰堅湯

C. 神效枯萸散

D. 清肝解鬱湯

20. 依《中醫外科講義》梅瘡潰爛時，穢膿浸淫，成片而痛者，使用下列何種藥物最適宜？

A. 防風通聖散

B. 鵝黃散

C. 楊梅一劑飲

D. 麻黃一劑飲

21. 關於傷後耳目失聰，下列敘述何者最適當？

A. 《靈樞·脈度》：「腎氣通於目，腎和則目能辨五色矣」，表明了腎與視力關係密切

B. 肝腎虧損之耳目失聰，多在損傷初期發生

C. 損傷後，若見眼周青紫瘀血，目睛脹痛，頭額劇痛，視力衰退甚至失明，應轉專科診治

D. 若見目睛淡白、眼花耳鳴、心悸怔忡、少氣懶言、四末少溫等證，杞菊地黃丸是合適之處方

22. 患者胸脅部受到撞擊，來診時患處腫痛、青紫，壓痛位置清楚固定，患者感覺胸悶，咳嗽疼痛加劇，診其脈弦中帶澀。下列何處方最適當？

A. 血府逐瘀湯

B. 二陳湯

C. 四君子湯

D.小柴胡湯

23.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損煩躁之證，煩躁而面赤，口乾作渴，脈洪大，按之如無者，治以下列何方最適宜？

A.當歸補血湯

B.獨參湯

C.加味歸脾湯

D.柴胡四物湯

24.患者如果在屈肘狀態下跌倒，肘尖著地受傷，下列何者為最不可能出現的臨床表現？

A.尺骨鷹嘴骨折

B.尺骨鷹嘴推移至肱骨前方

C.肘關節後脫位

D.肱骨下端插入尺骨橈骨間

25.中年患者，長期低頭工作，頸肩痠痛，偶覺一側肩臂作麻，勞累時加重，此患者頸椎X光片之表現，下列何者最少見？

A.骨質增生

B.椎間隙狹窄

C.椎間盤突出

D.椎間孔變小

26.依《諸病源候論·腰背病諸候》所述，凡腰痛病有五，下列敘述何者錯誤？

A.少陰，少陰腎也，十月萬物陰氣傷，是以腰痛

B.風痺，風寒著腰，是以痛

C.腎虛，役用傷腎，是以痛

D.腎腰，墜墮傷腰，是以痛

27.臨床急性腰部疼痛，下列何種損傷最少見？

A.腰部肌筋膜損傷

B.腰部韌帶損傷

C.腰椎間盤突出

D.腰椎骨關節炎

28.50歲男性，平日工作須負重，勞累時腰部有輕微痠痛，近日腰部疼痛加劇，行走時腰部疼痛、無力，雙下肢疼痛、麻木、無力，持續行走則症狀加劇，甚至無法行走，蹲下休息後症狀即緩解，最可能之原因為何？

A.僵直性脊椎炎

B. 腰椎椎管狹窄症

C. 腎痹

D. 梨狀肌症候群

29. 45歲男性，跌傷當日前來看診，腹、背疼痛，下肢瘀青，腫脹發熱。下列處方何者最適宜？①獨活寄生湯 ②膈下逐瘀湯 ③疏經活血湯 ④清營湯 ⑤補中益氣湯

A. ①③

B. ①④

C. ②④

D. ③⑤

30. 28歲男性建築工人急性腰痛，診斷為椎間盤突出，下列敘述何者錯誤？

A. 疼痛多伴隨腰痛及大腿後側、小腿外側痛，先腰痛而腿痛者多

B. 臨床根據髓核突出形式分類，以前突出、單側型為多

C. 多數患者有膝、跟腱反射異常

D. 發生脊椎側彎機率高

31. 有關脛骨結節骨骺炎之敘述，下列那些正確？①又稱為脛骨粗隆骨骺炎 ②好發於5~9歲的兒童 ③好發於11~18歲的族群 ④因髕韌帶牽拉脛骨結節骨骺導致 ⑤通常因為脛前肌收縮過度拉扯到脛骨結節引起


A. ①②⑤

B. 僅①③④

C. ①③④⑤

D. ②④

32. 如圖所示，測試者沿黑色箭頭給與大拇指指間關節一阻力，被測試者將大拇指從0度出力到70度，下列敘述何者最適宜？①測試大拇指的伸直（extension）肌力 ②主要為橈神經與尺神經支配 ③月狀骨脫位壓迫正中神經可能造成此動作無力 ④尺神經壓迫則此動作無力 ⑤頸椎第8神經根受壓迫則此動作無力



A. ①②③④

B. ①②⑤

C. ③⑤

D. 僅③

33. 有關下肢損傷與其檢查的敘述，下列何者正確？
 ①髖關節以前脫位最多見，患肢外形增長，呈外展外旋及輕度屈曲畸形
 ②測量腿長由肚臍測量到踝部內踝，若距離不等即表示真正腿長不等
 ③Thomas test為檢測髖部屈曲性攣縮之測試
 ④股骨頸過度前傾會造成腳尖向內的步態

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

34. 胸骨骨折最常發生在下列何處？

A. 劍突

B. 胸骨柄

C. 胸骨體部

D. 胸骨基底

35. 有關股骨轉子間骨折的敘述，下列何者最不適當？

A. 股骨轉子間骨折之定義為，股骨頸基部到小轉子水平以上之部位發生骨折，即稱之

B. 股骨轉子間的不完全或嵌插骨折，通常不需要復位，也不需要固定，僅需牽引即可

C. 股骨轉子間骨折，常因跌倒導致患處遭受過度外旋、內旋或內翻的傳導暴力造成

D.股骨轉子的血液循環豐富，極少會出現不癒合的狀況，但容易發生髌外翻

36.下列何者不是神經牽張的檢查法？

A.直腿抬高測驗（SLRT）

B.Hoover測驗

C.Kernig測驗

D.Beevor測驗

37.臀上皮神經炎最常見的壓痛點，與下列穴位何者最接近？

A.章門

B.急脈

C.居膠

D.承扶

38.有關類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）的敘述，下列何者正確？①流行病學發生率是女性多於男性 ②常見的表現是同時多處關節炎 ③約50%的患者類風濕因子（rheumatoid factor）呈陽性反應 ④證見關節腫大且紅腫熱痛甚及因風濕流注筋脈化熱傷陰，可用桂枝芍藥知母湯 ⑤如寒濕凝著關節且無熱象，可用烏頭湯治之

A.①②③

B.③④⑤

C.僅④⑤

D.①②④⑤

39.下列有關骨質疏鬆症的敘述，何者正確？①原發性可分為老年性骨質疏鬆症與更年期骨質疏鬆症等 ②骨密度T值（T-score）小於或等於-1.5即可診斷為骨質疏鬆症 ③骨質疏鬆症建議補充足量維生素D與鈣質 ④骨質疏鬆症常見的骨折部位為前臂、手腕、髖部與脊椎

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

40.下列何種理學檢查並非用於測試前十字韌帶損傷？

A.anterior drawer test

B.Lachman test

C.Pivot shift test

D.Clarke's test

41.關於跖趾外翻之敘述，下列何者最不適宜？

- A.可能原因為長期站立、經常穿緊小的尖頭鞋
- B.可能產生內側蹠趾關節（metatarsophalangeal joints）滑囊炎
- C.此畸形又稱為Pes Cavus
- D.可能造成全身骨骼和關節歪斜，如O型腿、膝蓋痛等症狀
- 42.關於臀中肌之敘述，下列何者錯誤？
- A.臀中肌無力，可出現特倫德倫堡步態（Trendelenburg gait）
- B.臀中肌止點在股骨大轉子外側面
- C.臀中肌由臀上神經支配
- D.志室穴直刺一寸五分即可觸及臀中肌
- 43.下列關於鎖骨關節脫位之敘述，何者最不適宜？
- A.胸鎖關節脫位臨床較少見，按鎖骨內端脫出方向，分為前脫位和後脫位，前脫位較後脫位為多
- B.肩鎖關節的穩定依賴肩鎖和喙鎖兩韌帶維繫，肩鎖韌帶尤為重要，破裂能引起全脫位
- C.勞動和運動中，經常性地使鎖骨外展，可能造成慢性勞損病因的胸鎖關節脫位
- D.肩鎖關節半脫位，觸診時肩峰與鎖骨不在同一平面；若全脫位則鎖骨外端明顯隆起，肩峰低陷
- 44.有關腳踝扭傷造成的傷害，下列敘述何者正確？
- A.若踝部在強力外翻（eversion）姿勢下扭傷，可能會波及足部造成第五蹠骨撕脫性骨折
- B.扭傷時若嚴重損及外側韌帶，在X光下可能會看到踝關節外側關節間隙增寬
- C.強力內翻（inversion）傷害若造成外踝骨折，多為撕脫性斜形骨折
- D.若後距腓韌帶及跟腓韌帶損傷明顯，X光可以看到內外踝間距增寬
- 45.患者膝蓋外側疼痛，有關局部解剖觸診之敘述，下列那些正確？①闊筋膜張肌，在髌骨外側，其遠端連接於腓骨外側，於患者伸膝時容易觸診 ②膝蓋外側副韌帶連接著股骨外上髁與脛骨平台外側，屈膝外展外旋髌部時容易觸摸到 ③股二頭肌肌腱遠端止於腓骨頭位置 ④前上脛腓韌帶位於脛骨與腓骨頭近端的關節縫
- A.①②
- B.②④
- C.①③
- D.③④
- 46.45歲男性，左手前三指麻1週，近1個月起從事保母工作，慣用左手抱幼童。關於其診療的敘述，下列何者正確？①進行Finkelstein test確認是否有正中神經壓迫 ②在腕關節的掌側進行敲擊看是否引發麻或電的不適感覺 ③檢查旋前圓肌是否有明顯的壓痛點 ④進行Phalen's test確認是否有橈神經壓迫 ⑤需再進一步確認麻木的分布區域是掌側或背側
- A.①②⑤

B. ①③④

C. ②③④

D. ②③⑤

47. 關於 de Quervain tenosynovitis 的敘述，下列何者錯誤？

A. 此病影響的是包覆在外展拇長肌腱和伸拇長肌腱的腱鞘結構

B. 急性期時，對患者施予 Finkelstein test 可誘發疼痛

C. WHAT test（腕部過度屈曲加拇指外展）也是此病的試驗之一

D. 懷孕是此病的危險因子之一

48. 20歲女性，跌倒以右手掌撐地，之後即覺手腕轉動有「卡卡」的感覺，中指無法伸直，握拳時第3掌骨頭明顯塌陷，最可能受傷的是下列那一個結構？

A. 月狀骨

B. 豆狀骨

C. 大多角骨

D. 鈎狀骨

49. 下列對於上肢傷筋、骨病的敘述，何者正確？

A. 大圓肌腱發炎，臨床表現會出現外展60~120度範圍的疼痛弧

B. 腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）有可能出現大、小魚際肌肉萎縮症狀

C. Tinel test 與 Allen test 被用於檢查腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）

D. 肘部的旋後動作會使用到肱二頭肌、旋後肌及肱橈肌

50. 下列何者為尺神經（ulnar nerve）支配的肌肉？

A. 喙肱肌

B. 肱橈肌

C. 尺側屈腕肌

D. 橈側屈腕肌

51. 70歲女性，2週前跌坐後臀部疼痛明顯坐姿疼痛，X光顯示左側坐骨骨折，因疼痛與嚴重便秘前來中醫骨傷科就診，證見腹滿腹脹、腹中堅實、疼痛拒按，按之痛甚，舌質紅，苔黃厚膩，下列敘述何者正確？①治宜攻下逐瘀 ②治宜養血潤燥 ③傷在骨盆用桃仁承氣湯 ④傷在骨盆用當歸雞血藤湯 ⑤可用增液承氣湯

A. ②④

B. ②⑤

C. ①③

D. ①④

52. 有關蹠趾關節脫位與損傷的敘述，下列何者正確？①第5蹠趾關節脫位較常見 ②多因外力導致，常迫使蹠趾關節過伸 ③常見近節趾骨基部脫向蹠骨頭的背側呈背側移位 ④《正骨心法要旨》：趾骨受傷，多與指骨相同，惟奔走急迫，因而受傷者多
- A. ①②
B. ②③
C. ①③
D. ②④
53. 有關脫位與神經損傷併發症的敘述，下列何者正確？①腕關節前脫位造成坐骨神經損傷 ②肩關節前脫位造成腋神經損傷 ③月狀骨脫位造成正中神經損傷 ④肘關節後脫位造成尺神經損傷 ⑤孟氏（Monteggia）骨折脫位造成正中神經損傷
- A. ②③⑤
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②⑤
54. 老太太今日早上發生橈骨遠端骨折，因為不願開刀，欲以中醫徒手復位及夾板外固定。關於包紮及固定的敘述，下列何者最不適當？
- A. 繃帶纏繞包紮前臂時，爪甲處要露出以方便評估循環的好壞
B. 經徒手復位及夾板外固定後，隔天手部可能更為腫脹，因此外固定時綁帶不要綁太緊
C. 返家後若發生局部有腫脹、疼痛、麻木、冰涼等情況，屬疾病自然發展過程，可不予理會
D. 使用夾板做外固定時，可利用不同種類的壓力墊來加強外固定的效果，但要避免造成壓迫性潰瘍的情況
55. 關於骨折所造成的神經、血管損傷併發症，下列何者最不適當？
- A. 肱骨幹骨折－正中神經損傷
B. 肱骨髁上骨折－正中神經損傷
C. 伸直型肱骨髁上骨折－肱動脈
D. 肱骨外科頸骨折－腋動脈
56. 關於肱骨近端骨折的敘述，下列何者最不適當？
- A. 大多為間接暴力所導致
B. 肩關節脫臼可能造成肱骨大結節撕脫性骨折
C. 肱骨近端骨折因結構問題，最容易發生在肱骨解剖頸
D. 骨折後所導致的持續移位，大部分是因為肌肉牽拉所導致
57. 患者2天前於交通事故中撞擊左胸，患處疼痛，無呼吸困難等併發症。經診斷為第5肋骨骨折，下列

敘述那些適當？①此患者無須手法整復 ②此時用藥以黃耆五物湯加減為主 ③患者疼痛難耐，可加雲南白藥或三七 ④患者的胸廓會出現吸氣時向內凹陷，呼氣時向外凸出的現象

A. ①④

B. ①③

C. ②④

D. ②③

58. 關於脊椎骨折合併脫位造成脊髓損傷的敘述，下列何者最適當？

A. 《聖濟總錄》稱此問題為「體惰」

B. 脊髓震盪是指患者雖僅有功能上暫時性傳導中斷，但預後不佳

C. 外傷性截癱具明顯的外傷史，X光片不只能顯示骨折、脫位的部位和椎管內有無碎骨片，也能準確地反映脊髓本身的損害程度

D. 脊髓斷裂是指脊髓本身遭受骨折脫位或異物的損傷，發生神經細胞的破壞，神經纖維束的撕斷，甚至脊髓完全橫斷等病變

59. 有關髌骨骨折的敘述，下列何者正確？①《素問·骨空論》：「膝解為骸關，俠膝之骨為連

骸。」，故髌骨又名連骸骨 ②髌骨縱裂骨折，其周圍筋膜及關節囊多保持完整，故骨折多為無位移骨折 ③髌骨橫裂骨折，好發於髌骨下三分之一處，常導致筋膜及關節囊撕裂 ④髌骨骨折之治療，可使用「抱膝」進行屈曲固定

A. ①②④

B. ②③④

C. ①②③

D. ①③④

60. 有關距骨骨折之敘述，下列何者正確？①距骨體前寬後窄，踝關節蹠屈（plantarflexion）時，可往側向移動，背屈（dorsiflexion）時，關節穩定性增加而較無法往側向移動 ②距骨常因創傷而導致供應距骨的血管損傷，容易發生距骨缺血性壞死 ③距骨頸骨折合併距下關節脫位或合併距骨體後脫位，常導致骨折間隙增加 ④常因自高跌下，足呈背屈位著地，導致跟骨與脛骨上下撞擊距骨，而常見距骨體骨折

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

61. 小兒疳積後，初起暗處不能見物，繼而眼珠乾燥，黑睛混濁，甚至糜爛破損為特徵的眼病，《秘傳眼科龍木論》稱之為疳積上目，下列何者非其病因病機？

A. 肝脾虧虛，不榮頭面

B.脾虛肝熱，肝熱上攻

C.脾虛濕困，精氣不化

D.下焦虛寒，大便頻泄

62.依據五輪學說，兩眦屬於五輪中的何者？

A.肉輪

B.血輪

C.氣輪

D.風輪

63.下列眼與臟腑關係之敘述，何者錯誤？

A.脾胃為後天之本，胃納脾運，則目得養，若飲食不節，又後感外邪，內外交熾可產生針眼、瞼弦赤爛

B.脾主運化，若津液不得敷布，則濕從內生、聚而成痰，可導致胞腫如桃

C.如久病失養，或過用寒涼藥物可致脾陽不振，導致內障如雲霧移睛

D.肝膽二經互為表裏，臨床上難以截然分開，用藥也常肝膽同治

64.關於風赤瘡癢，下列敘述何者錯誤？

A.脾胃濕熱，復受風邪，風濕熱三邪結於胞瞼

B.胞瞼腫癢，皮色紅赤，少量丘疹，屬脾經風熱，治用除風清脾飲加減

C.外治可以西瓜霜眼藥水點眼

D.風火上攻者，眼瞼紅赤如塗硃，局部潰爛，治用普濟消毒飲加減

65.關於倒睫拳毛的敘述，下列何者正確？

A.皮緊弦鬆、疼痛

B.肝風脾熱相壅而成

C.治宜通脾瀉胃湯

D.大眦多虛，小眦實

66.《銀海精微》云：「初起麻木疼痛，汪汪淚出，病勢洶湧，卒暴之變莫測，……治稍遲，或控膿」應是下列何眼病？

A.突起睛高

B.黃膜上衝

C.異物入目

D.疳積上目

67.下列何書對「疳積上目」記載較早？

- A.《銀海精微》
- B.《秘傳眼科龍木論》
- C.《眼科心法》
- D.《審視瑤函》

68.關於鼻咽癌的臨床症候，下列何者較不常見？

- A.吞嚥疼痛
- B.耳鳴、聽力減退
- C.頸項惡核
- D.鼻衄

69.關於旋耳瘡的證治敘述，下列何者正確？①多發於耳前或耳後縫間 ②又稱為黃水瘡、月蝕瘡 ③以局部性的潮紅、糜爛、滲出黃色脂水、不易結痂為主要症狀 ④主要成因為風熱毒邪外侵或肝膽濕熱上蒸

- A.①②
- B.①③
- C.②③
- D.②④

70.鼻出血外用導引止血法中以大蒜搗爛敷於何穴，引熱下行減少上炎，以達止血？

- A.三陰交
- B.足三里
- C.湧泉穴
- D.陽陵泉

71.風熱乳蛾證屬邪熱傳裏，肺胃熱盛，治以下列何方最適宜？

- A.疏風清熱湯
- B.普濟消毒飲
- C.桑菊飲
- D.知柏地黃丸

72.口瘡若熱邪較盛，潰點多，甚者融合成小片，疼痛加重，甚或出現腮舌俱腫，以及大便秘結等裏熱蘊結症狀，應上清膈熱，下泄熱毒，宜涼膈散加何藥最適合？

- A.黃柏、知母
- B.黃柏、石膏
- C.黃連、石菖蒲

D.黃連、生地

73.患者黑睛周邊驟生白翳，漸漸厚闊，中間低陷，白睛混赤，畏光流淚，眼瞼難睜，舌紅苔薄黃，脈浮數。關於此患者的狀況，下列敘述何者正確？

A.最有可能的診斷為蟹睛症

B.本病在《秘傳眼科龍木論》即有記載

C.本病初起，多係熱熾腑實，治宜瀉熱通腑

D.本病以虛證為主

74.古籍中治療耳鼻咽喉口齒疾病的記載，下列敘述何者錯誤？

A.《千金翼方》上載有燒灼治療咽喉病的方法

B.《外臺秘要》上載有「升麻揩齒方」

C.《證類本草》上載有用汞合金鑲牙補牙的方法

D.《洪氏集驗方》有應用壓迫頸外動脈以止鼻衄的報導

75.下列何書最早將小兒耳鼻咽喉口齒疾病作專卷論述？

A.《金匱要略》

B.《諸病源候論》

C.《傷寒論》

D.《千金要方》

76.耳殼流痰宜祛痰散結，疏風通絡，治以二陳湯祛痰，為加強祛痰之力，應加入何藥為宜？

A.地龍、鬱金、柴胡

B.丹參、當歸、黃耆

C.竹茹、枳實、膽星

D.僵蠶、絲瓜、白朮

77.關於「鼻鼽」之外治，下列何者最適宜？

A.用滴鼻靈滴鼻，或以柴胡注射液滴鼻

B.辛夷花適量研末，每用少許吹鼻中，以通透鼻竅

C.宜用滋養潤燥藥物，可選用菴蓉滴鼻液、蜂蜜、芝麻油加冰片少許滴鼻，每日2~3次

D.宜用辛散風寒，行氣活血，兼以解毒通竅的藥物

78.患者，鼻內肌膜腫脹，甚至鼻甲硬實不消，凹凸不平，但鼻腔內無新生物堵塞，其診斷為何種鼻病？

A.鼻塞

B.鼻鼽

C.鼻槁

D.鼻息肉

79.關於「風熱喉痹」之敘述，下列何者錯誤？

A.常因氣候急劇變化，起居不慎，肺衛失固，而為風熱邪毒趁虛侵犯

B.針刺療法：選合谷、內庭、曲池為主穴，天突、少澤、魚際為配穴

C.病變部位主要在喉核，故喉核紅腫，有黃白色膿點

D.護理及預防：少食用煎炒炙燂之物

80.口齒唇舌病用藥粉吹布於患部，以達到清熱解毒，消腫止痛，祛腐生肌的目的，是局部常用的有效療法，下列何者是一般常用的藥方？

A.如意金黃散

B.冰硼散

C.龍眼白鹽散

D.四黃散